



Familien: Landasseln, *Porcellionidae*, *Oniscidae*

Wissenschaftlicher Name der Kellerassel:

Porcellio scaber Latreille



KONTAKT

Wissenschaftlicher Name der Mauerassel:

Oniscus asellus (Linné)

► **Biologie:** Je nach Jahreszeit Ablage von ca. 30 (Winter) bis 85 (Sommer) Eiern, die vom Weibchen in einem Brutbeutel auf der Körperunterseite getragen werden.

Schlupf nach ca. 35 Tagen, Tiere verbleiben aber noch ca. 15 Tage im Beutel. Danach noch ca. 100 Tage bis zur Geschlechtsreife. Atmung erfolgt teilweise noch über Kiemen; benötigen eine hohe Luftfeuchtigkeit.

► **Vorkommen:** Im Freiland im Kompost, unter Steinen und in feuchten, schattigen Schlupfwinkeln, teilweise in Gewächshäusern; im Haus bei hoher Luftfeuchtigkeit vor allem in Lagern und Kellern.

► **Nahrung:** Bevorzugen abgestorbenes, möglichst feuchtes pflanzliches Material; fressen gelegentlich Pflanzenkeimlinge sowie lagerndes Gemüse und Obst an.

**Umweltberatung
der Stadt Münster**
Öffnungszeiten:
Mo bis Mi 8–16 Uhr Kundenzentrum Planen-Bauen-Umwelt
Do 8–18 Uhr Stadthaus 3
Albersloher Weg 33
Fr 8–13 Uhr 48155 Münster
Tel. 0251/492-6767
umweltberatung@stadt-muenster.de

Abbildungen in diesem Faltblatt aus: R. Fritsche / R. Keilbach, *Die Pflanzen-, Vorrats- und Materialschädlinge Mitteleuropas*, Gustav Fischer Verlag, 1994, S. 55, Abb. 62
© Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin


Impressum

Herausgeberin: Stadt Münster in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen – Pflanzenschutzdienst –

Dezember 2004, 1.000

Ungebetene Gäste:

2



Kellerasseln Mauerasseln

Tipps
zum Umgang
mit Schädlingen
im Haus



Amt für
Grünflächen und
Umweltschutz




Kellerassel Mauerassel

Ca. 15 mm lang,
raue und körnige schiefergraue bis schwarze Haut;
gehören zu den Ranzenkrebse.

GEGENMASSNAHMEN



- ▶ **Vorbeugen:** Treten Asseln verstärkt im Gewächshaus auf, geben Sie abgestorbene Blätter u. Ä. auf den Kompost. So entziehen Sie den Asseln die Lebens- und Versteckmöglichkeiten. Vorbeugend kann der Kompost – wo möglich – etwas vom Gewächshaus entfernt aufgesetzt werden.
- ▶ **Lagern:** Lagern Sie nur unbeschädigtes Obst und Gemüse kühl und trocken ein. Kontrollieren Sie die Vorräte regelmäßig und sortieren Sie die beschädigten oder faulenden Stücke umgehend aus. Dann finden Asseln keine Nahrungsgrundlage.



Kellerassel



Asseln sind ein wichtiger Faktor bei der Umsetzung von Pflanzenabfällen zu Kompost. In trockenen, kühlen Räumen wird man sie nicht antreffen.

Die Mauerassel ist etwas seltener als die Kellerassel. Sie wird etwas größer und hat höhere Ansprüche an die Luftfeuchtigkeit.

Mauer- und Kellerasseln sind nur selten schädlich. Sie übertragen keine Krankheiten und werden bei sachgerechter Vorratshaltung auch keine nennenswerten materiellen Schäden verursachen.



SCHÄDEN

Meist keine nennenswerten Schäden.